

Памятка пациенту перед проведением процедуры: промывание миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор».

Промывание миндалин аппаратом «Тонзиллор» происходит путем создания отрицательного давления при установке насадки аппарата на небную миндалину. При этом происходит омывание миндалин дезинфицирующим раствором и воздействие ультразвуком на ткани миндалин. Промывание «тонзиллором» позволяет промыть более глубокие отделы миндалин и улучшить кровообращение в них. Ультразвук улучшает выведение казеозных масс из лакун миндалин, а также оказывает мощное антибактериальное, противовирусное и противогрибковое воздействие, противовоспалительный и иммуномодулирующий эффект. Проводится курсом 8-10 процедур ежедневно или через день.

Показания:

1. Хронический тонзиллит
2. Частое накопление казеозных масс (пробок) в небных миндалинах
3. Неэффективность промывания миндалин ручным методом (при помощи шприца).
4. Бактериальное носительство золотистого стафилококка, гемолитического стрептококка;
5. Грибковое поражение миндалин.

Порядок проведения процедуры:

Перед началом проведения процедуры, на слизистую глотки, методом распыления, наносится раствор анестетика (10% лидокаин), для подавления глоточного рефлекса и снижения дискомфорта в горле во время процедуры. Насадка «тонзиллора» устанавливается на миндалину и фиксируется на ней на 30 секунд. Пациент во время процедуры активно дышит ртом, расслабляя челюсть. Промывающий раствор подается внутри насадки, не попадая в ротовую полость. Одновременно производится «озвучивание» миндалин ультразвуком. Через 30 секунд, в положении наклонив голову вперед, насадка снимается с миндалин, остатки раствора сплевываются в лоток.

Второй этап процедуры: другой насадкой производится лекарственный фонофорез - введение лекарства в ткань миндалин с помощью ультразвука.

Во время этапа промывания может быть небольшая болезненность или дискомфорт связанный с выраженным рвотным рефлексом у некоторых пациентов. Во время процедуры необходимо держать голову в неподвижном зафиксированном состоянии, прижав к подголовнику кресла, чтобы минимизировать нежелательные явления.

Противопоказания:

1. Острые инфекционные заболевания;
2. Обострение хронического тонзиллита;
3. Боль, налеты на миндалинах;
4. Онкология любой локализации;
5. Период беременности;
6. ВИЧ-инфицирование.

После проведения «Тонзиллор» необходимо соблюдать рекомендации:

1. Желательно за 1,5-2 часа до процедуры не есть, чтобы снизить рвотный рефлекс;
2. Не принимать пищу в течение 30 минут после процедуры;
3. Исключить из рациона очень горячую, холодную, острую и грубую сухую пищу;
4. После процедуры, при необходимости, врачом будет назначена местная, противовоспалительная терапия лекарственными средствами.

Возможные явления при лечении на «Тонзиллор»:

1. Возможно незначительное количество сукровичного отделяемого из миндалин;
2. Боль в горле, першение;
3. Повышение температуры до субфебрильных цифр;
4. Появление гематом на миндалинах или на небных дужках.

Возможные медицинские осложнения на промывание миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор»:

1. Кровотечение из мягких тканей глотки и миндалин;
2. Афтозный стоматит на небных дужках;
3. Обострение хронического тонзиллита;
4. Аллергические реакции на анестетик, антисептические средства;
5. Вегетососудистая реакция на медицинское вмешательство в виде гипертонического или гипотонического состояния, тахикардия;
6. При лабильности психики возможна психогенная реакция на стресс (психотравма)

Я информирован(а) что при возникновении осложнений и/или ухудшения общего состояния должен незамедлительно обратиться к лечащему или дежурному ЛОР врачу для оценки состояния и корректировки лечения

Я имел(а) возможность задать все интересующие меня вопросы и получил на них исчерпывающие ответы.

дата, ФИО, разборчивая подпись пациента